

Türkiye'de Dağlar



Kurumu deŝlor:

✓ Orogenez hareketler (dağ oluşumu) sonucu oluşan kıvrımların kubbe şeklinde yükselen kısımlarına antiklinal, çukuk gibi çukurlaşan kısımlara senklinal denir.



N Toroslar, iç Batı Anadolu Dağları, Küçük Anadolu Dağları kurumlu dağlardır.

Kırıklı doçlar:

➤ Orojenez sırasında bazı temel tabakalar kırılılmayacak kadar derinse kırılır. Bu kırık hatlarına fay denir. Kırılma sonucunda, iki parçadaki faylar boyunca yükselen kısma **horst** alınan kısma **graben** denir.

Ülkemizde Batı Anadolu'da görülür.

Vulkanik olaylar:


• Volkanik hareketler sonucu çıkan malzemelerin birikerek volkan konileri ve volkanik dağları oluşturmasıdır.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygındır.

- ✓ Tertiary'de dağların genel yönelişi doğu-batı yönündedir.
- ✓ Akdeniz ve Karadeniz'e paralel yönelen dağlar kıvrılma ile Ege Denizi'nde dik yönelen dağlar ise kırılma ile oluşmuştur.

Kıyıya paralel ise

- ➔ Nemli hava iç kesimlere sokulamaz.
- ➔ Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı fazla olur.
- ➔ Ulaşım iç kesimlerde zordur.
- ➔ Ulaşım maliyetli olur. (yol yapımı)
- ➔ Limanların hinterlandı dar olur.
- ➔ Kıta sahanlığı dardır.
- ➔ Dalga aşınmasına etkileri fazladır.
- ➔ Delta ovalı oluşumu zordur.
- ➔ Koy, körfez, yarımada, ada ve doğal liman sayısı az olur.
- ➔ Kıyıda kıyı tipi özelliği görülür.



Kıyıya dik ise

- ➔ Nemli hava iç kesimlere daha kolay sokulur.
- ➔ Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı az olur.
- ➔ Ulaşım iç kesimlerde kolay sağlanır.
- ➔ Yol yapım maliyetleri daha azdır.
- ➔ Limanların hinterlandı geniş olur.
- ➔ Kıta sahanlığı geniştir.
- ➔ Dalga birikimi etkileri fazladır.
- ➔ Delta ovalı oluşumu kolaydır.
- ➔ Kıyı şeridi girintili çıkıntılıdır.
- ➔ Koy, körfez, yarımada, ada ve doğal liman sayısı fazladır.
- ➔ İçine kıyı tipi özelliği görülür.

