


Türkiye'de Ova ve Platolar



Türkiye'de bulunan ova ve platolar

Plato: Fıkarcular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksek dışlıklara plato denir. İa Anadolu Bölgesi, platoların en geniş yer kapladığı bölgedir.

- İa Anadolu Bölgesi'nde Obruk, Cihanbeyli, Haymana, Bazar, Uşak, Yalova
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum - Kars - Marmarosa Gataca - Kocaeli
- Akdeniz Bölgesi'nde Teke, Tazeli
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep, Şanlıurfa
- Ege'de Uşaklıkaya
- Karadeniz'de Perşembe platoları yayılmış gösterir.

Oluşumlarına göre platolar

Aşınım Oluşumu

Gataca-Kocaeli
Perşembe Plateau

Volkanik

Erzurum-Kars Plateau
Ardahan Plateau

Koristik

Tazeli Plateau
Teke Plateau

Tabaka Oluşumu

Haymana
Cihanbeyli
Obruk
Bazar
Uşaklıkaya
Gaziantep
Şanlıurfa

Ova: Çevrelerine göre alçakta kalmış, ağırlıklı olarak alüvyon örtülü eğimi az, akarsuların birikim yaptıkları düzlüklerdir. Ülkemizde yükseltisi deniz seviyesinden başlar, doğuya gidildikçe artar.

Oluşumlarına göre ovalar

Delta Ovaları: Akarsuların kaynaktan itibaren taşıdığı malzemeyi kıvrıgında biriktirmesi sonucu oluşur. Ülkemizde;

Garşamba Ovası'nı	→	Yeşilirmak Nehri	
Bafra Ovası'nı	→	Kızılırmak Nehri	
Gökova 'yı	→	Seyhan ve Ceyhan nehirleri	
Silifke Ovası'nı	→	Göksu Nehri	
Balat Ovası'nı	→	Büyük Menderes Nehri	
Selçuk Ovası'nı	→	Küçük Menderes Nehri	
Menemen Ovası'nı	→	Gediz Nehri	
İkizli Ovası'nı	→	Bakırçay Nehri	oluşturmuştur.

Karstik Ovalar (Polje): Kalkerin (kireç taşı) çözünmesiyle oluşan ovalardır. Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin güney kısmında yaygındır.

Ülkemizde görülen karstik ovaları;

T A K K E M
e z o e i u
f i r s m ü
e p k t a d
n a u e l a
n s t i i
i m i

olarak kodlayabiliriz.

Tektonik (Çöküntü) Ovaları: Alp orojenezisi sırasında meydana gelen yer kabuğu hareketleri sonucu kırılma ve çökmeyle oluşan alanların alüvyonlarla dolmasıyla oluşmuştur. Ülkemizin jeolojik olarak genç araziye sahip olması bu ova türünü yaygın kılmıştır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı, iç ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kısımlarında yer alır.

1. İstanbul ve Gökçeköle bölgelerinin oluşumunu aşağıda verilen jeolojik devirlerden hangisinde meydana gelmiştir?

- A.) İktet zaman
- B.) I. Jeolojik zaman
- C.) II. Jeolojik zaman
- D.) III. Jeolojik zaman
- E.) IV. Jeolojik zaman

2. Aşağıdakilerden hangisi püskürtü kayalarına örnek verilemez?

- A.) Andezit
- B.) Antrasit
- C.) Bazalt
- D.) Granit
- E.) Tef

3. Aşınmaya karşı dirençli kayalar üzerinde dik yer şekilleri oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yığın aldığı sahada dik yer şekilleri oluşturur?

- A.) Granit
- B.) Bazalt
- C.) Kum taşı
- D.) Gobra
- E.) Siyenit

4. Püskürtü ve tortul kayaların metamorfik kayaca dönüşmesi için gerekli şartlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A.) Sıcaklık - basınç
- B.) Aşınma - erime
- C.) Yüksek sıcaklık - basınç
- D.) Erime
- E.) Katılma - aşınma

5. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların etkisi yoktur?

- A.) Peri bacaları
- B.) Dev kovanı
- C.) Menderes
- D.) Kırgıbayır
- E.) Barkon

SORUÇÜZÜ

Cevap Performansı

1	2	3	4	5
E	B	C	C	E
D	A	B	D	D
C	D	E	R	A
B	E	A	A	B
A	E	D	E	C

Performansını görmek için cevaplarını işaretleyip, aralarını çizgi ile birleştir.

Doğru cevaplar
E, B, C, C, E